

# TERAPIA POR ONDAS DE CHOQUE EXTRACORPÓREA NO TRATAMENTO DA BURSITE TROCANTERIANA

Ana Cláudia Souza (Cortrel - Rio de Janeiro - RJ) Paulo Roberto Pires Rockett (Ortosom - Porto Alegre - RS)

Flavia Arkader (Cortrel - Rio de Janeiro - RJ) Paulo Roberto Dias dos Santos (Orthomaster - São Paulo - SP) - Brasil



## OBJETIVO

Apresentação da metodologia e dos resultados do tratamento da Bursite Trocânteria crônica através da Terapia por Ondas de Choque (TOC)

Extracorpórea realizada em três Centros Ortopédicos Brasileiros

## MATERIAL E MÉTODOS

No período de 35 meses de Junho de 2002 a Maio de 2005, foram tratados 46 quadris de 43 pacientes que apresentavam Bursite Trocânteria crônica, sendo avaliados sob os critérios de inclusão e exclusão da Sociedade Brasileira de Terapia de Ondas de Choque (SBTOC) e da Sociedade Internacional de Terapia por Ondas de Choque aplicada ao Sistema Musculoesquelético (ISMST)

### Critérios de Inclusão

- ✓ Dor por um período de 6 meses
- ✓ Insucesso no tratamento conservador mínimo de 3 meses
- ✓ Após 6 semanas da última infiltração
- ✓ Insucesso no tratamento cirúrgico
- ✓ Ter realizado três das seguintes medidas conservadoras:
  - Medicação ou Infiltração
  - Cinesioterapia
  - Eletroterapia
  - ultra-som
  - Termoterapia
  - Acupuntura
  - Terapia Neural

### Critérios de Exclusão

- ✓ Coagulopatias
- ✓ Gravidez
- ✓ Infecção aguda
- ✓ Marcapasso
- ✓ Placa fisária
- ✓ Tumores Malignos
- ✓ Neuropatia diabética



Os procedimentos foram realizados sob anestesia local, em clínica ambulatorial, utilizando o REFLECTRON (aparelho eletro hidráulico HMT - High Medical Technologies) e os protocolos recomendados. Como na maioria dos 613 casos das diversas patologias de partes moles tratadas e acompanhadas, quarenta e dois quadris (91,3%) necessitaram apenas de uma única aplicação, quatro (0,7%) cotovelos de duas aplicações e nenhum quadril necessitou de três aplicações.

Patologia	Aplicação		
	uma	duas	três
Tendinite calcárea do ombro	145	17	4
Tendinose do ombro	59	4	2
Epicondilite lateral	80	12	1
<b>Bursite Trocânteria</b>	<b>42</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Tendinose do tendão calcâneo com ou sem calcificação	91	7	3
Fascite Plantar	128	11	3

As reaplicações eram realizadas no intervalo de 60 ou 90 dias. Utilizamos avaliação ecográfica, radiológica, a escala visual e analógica da dor (VAS) e os critérios de Roles e Maudsley na análise dos resultados em 45, 90 e 180 dias.

Roles and Maudsley score		
Grade 1	Excellent	no pain, full movement and activity
Grade 2	Good	occasional pain, full movement and activity
Grade 3	Acceptable	some discomfort after prolonged activity
Grade 4	Poor	pain limiting activity


Os pacientes foram avaliados com radiografias e ultra-sonografia e acompanhados 45, 90 e 180 dias.



## COMPLICAÇÕES

- ✓ Edema
- ✓ Petéquias
- ✓ Equimoses

## RESULTADOS



Pelos critérios de Roles e Maudsley após 6 meses de tratamento 42 quadris (91,3%) apresentaram "excelentes" e "bons" resultados (grau I e II) e 4 pacientes (8,7%) pobres" (grau IV).

## CONCLUSÃO

A TOC deve ser considerada uma alternativa no tratamento das Bursites Trocânterias crônicas resistentes aos tratamentos convencionais por ser um método eficaz, não invasivo, e que não apresenta complicações significativas; diminuindo assim, os riscos de um procedimento cirúrgico e os custos operacionais envolvidos.